

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Наказ Міністерства охорони**  
**здоров'я України**  
**25.02.2020 № 527**  
**Реєстраційне посвідчення**  
**№ UA/3332/01/01**  
**UA/3332/01/02**

**ЗМІНИ ВНЕСЕНО**  
**Наказ Міністерства охорони**  
**здоров'я України**  
**20.01.2021 № 90**

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування лікарського засобу**

**НАФТИЗИН®**  
**(NAPHTIZIN®)**

**Склад:**

діюча речовина: naphazoline;

1 мл препарату містить нафазоліну нітрату 0,5 мг або 1 мг;

допоміжні речовини: кислота борна, вода очищена.

**Лікарська форма.** Краплі назальні.

**Основні фізико-хімічні властивості:** прозора, безбарвна або злегка жовтувата рідина.

**Фармакотерапевтична група.** Протинабрякові та інші препарати для місцевого застосування при захворюваннях порожнини носа. Симпатоміметики. Код ATX R01A A08.

**Фармакологічні властивості.**

**Фармакодинаміка.**

Нафтизин® чинить виражену судинозвужувальну дію на периферичні судини завдяки впливу на α-адренорецептори. При нанесенні на слизові оболонки зменшує набряк, гіперемію, ексудацію, що сприяє полегшенню носового дихання при ринітах. Нафазолін сприяє відкриттю і розширенню вихідних проток придаткових пазух носа і євстахієвих труб, що покращує відтік секрету і запобігає осіданню бактерій.

**Фармакокінетика.**

При місцевому застосуванні нафазолін повністю всмоктується.

Терапевтична дія настає протягом 5 хвилин і триває 4–6 годин при інTRANАЗАЛЬНОМУ застосуванні.

**Клінічні характеристики.**

**Показання.**

Гострий риніт. Як допоміжний засіб при запаленні навколоносових пазух та середнього вуха. Для зменшення набряку слизової оболонки під час діагностичного втручання.

**Протипоказання.**

Підвищена чутливість до будь-яких компонентів лікарського засобу.

Сухе запалення слизової оболонки носа.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Застосування Нафтизину® одночасно з інгібіторами моноаміноксидази (MAO),

трициклічними антидепресантами, мапротиліном або протягом кількох днів після їх відміни може спричинити підвищення артеріального тиску.

### ***Особливості застосування.***

Лікарський засіб застосовувати з великою обережністю при тяжких захворюваннях серцево-судинної системи (артеріальна гіпертензія, ішемічна хвороба серця), при цукровому діабеті, гіпертиреозі, феохромоцитомі, супутньому застосуванні інгібіторів МАО або інших препаратів, що можуть чинити гіпертензивну дію. Обережність необхідна під час загальної анестезії із застосуванням анестетиків, що підвищують чутливість міокарда до симпатоміметиків (наприклад, галотан), а також при бронхіальній астмі.

При застосуванні високих доз препарату можливий розвиток таких побічних ефектів з боку серцево-судинної та нервої систем, як серцебиття, артеріальна гіпертензія, аритмія, головний біль, запаморочення, сонливість або безсоння.

Важливо уникати довготривалого застосування та передозування, особливо у дітей. Довготривале застосування препаратів, призначених для зняття набряку слизової оболонки, може привести до набряку та подальшої атрофії слизової оболонки носа.

### *Застосування у період вагітності або годування груддю.*

Немає даних щодо здатності нафазоліну проникати крізь плацентарний бар'єр або у грудне молоко. Тому до призначення препарату жінкам у період вагітності або годування груддю слід уважно розглянути усі можливі ризики та користь від лікування та призначати лікарський засіб, якщо це є абсолютно необхідним.

### *Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.*

Застосування лікарського засобу Нафтізин<sup>®</sup> у рекомендованих дозах не впливає на здатність керувати транспортними засобами або механізмами. При перевищенні рекомендованих доз можливі запаморочення та сонливість.

### ***Спосіб застосування та дози.***

Нафтізин<sup>®</sup> закапують у кожен носовий хід, відкинувши голову трохи назад та відхиливши її вправо при закапуванні у праву ніздрю і вліво – при закапуванні у ліву ніздрю.

З лікувальною метою. Дорослим та дітям віком від 15 років – по 1–3 краплі 0,05 %–0,1 % розчину у кожен носовий хід.

*Дітям віком 3–6 років* закапують розчин 0,05 % по 1–2 краплі у кожен носовий хід; *дітям віком 6–15 років* – по 2 краплі у кожен носовий хід.

Нафтізин<sup>®</sup> застосовувати 3 рази на день, але не частіше ніж через 4 години.

Нафтізин<sup>®</sup> не можна застосовувати більше 5 днів дорослим та більше 3 діб – дітям.

Повторно Нафтізин<sup>®</sup> можна застосовувати лише через кілька діб.

У разі носової кровотечі використовувати тампони, зволожені 0,05 % розчином препарату.

З діагностичною метою (наприклад, для діагностики та лікування назальних поліпів). Після очищення носової порожнини у кожен носовий хід закапувати по 3–4 краплі 0,05 %–0,1 % розчину або вводити на 2–3 хвилини тампон, змочений у 0,05 %–0,1 % розчині.

У разі набряку голосових зв'язок уприскувати 1–2 мл препарату гортанним шприцом.

### ***Діти.***

Дітям віком від 3 до 15 років можна застосовувати Нафтізин<sup>®</sup> 0,05 %.

Дітям віком від 15 років можна застосовувати Нафтізин<sup>®</sup> 0,1 %.

### ***Передозування.***

Передозування або випадкове проковтування препарату може спричинити системну побічну дію: нервозність, підвищену пітливість, головний біль, тремор, тахікардію, відчуття серцебиття, артеріальну гіпертензію. Можуть виникнути ціаноз, нудота, підвищення

температури тіла, спазми, зупинка серця, набряк легенів, психічні порушення, блідість шкіри, серцевий напад.

Пригнічувальний вплив на центральну нервову систему проявляється такими симптомами, як зниження температури тіла; брадикардія; підвищена пітливість; сонливість; шок, схожий на гіпотензивний; апноє; кома. Ризик передозування зростає у дітей, які є більш вразливими до негативного впливу, ніж дорослі.

Лікування симптоматичне.

### ***Побічні реакції.***

При застосуванні у рекомендованих дозах Нафтізин® зазвичай переносяться добре. У пацієнтів з підвищеною чутливістю лікарський засіб зрідка може спричинити печіння та сухість слизової оболонки носа. У поодиноких випадках може з'являтися відчуття сильної закладеності носа.

Тільки у поодиноких випадках виникає системна побічна дія (найчастіше при передозуванні):  
з боку імунної системи: алергічні реакції, включаючи набряк Квінке, печіння;  
з боку нервової системи: нервозність, головний біль, тремор;  
з боку серцевої системи: тахікардія, серцебиття;  
з боку судинної системи: артеріальна гіпертензія;  
з боку шкіри та підшкірних тканин: підвищена пітливість.

Тривале (довше 5 днів для дорослих та довше 3 днів для дітей) або часте застосування лікарського засобу може привести до звикання, що супроводжується інтенсивним набряком слизової оболонки носа, який виникає через відносно короткий проміжок часу після застосування. Довготривале застосування препарату може призводити до ушкодження епітелію слизової оболонки, пригнічення активності війок епітелію та спричинити необоротне ушкодження слизової оболонки і розвиток сухого риніту.

**Термін придатності.** 3 роки.

Після відкриття флаconа термін придатності препарату – 28 діб.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.

### **Умови зберігання.**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C. Зберігати в недоступному для дітей місці.

### **Упаковка.**

По 10 мл у флаconі скляному. По 1 флаconу в пачці.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.

### **Виробник.**

АТ «Фармак».

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.**

Україна, 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 74.

**Дата останнього перегляду.** 20.01.2021.