

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування лікарського засобу**

**ВІС-НОЛ®**  
**(VIS-NOL)**

**Склад:**

*діюча речовина:* bismuth subcitrate;

одна капсула містить вісмуту субцитрату колоїдного 499,8 мг у перерахуванні на  $\text{Bi}_2\text{O}_3$  120 мг;

*допоміжні речовини:* крохмаль картопляний, кальцію стеарат;

*желатинова капсула містить:* желатин, титану діоксид (E171), хіноліновий жовтий (E104), жовтий захід FCF (E110).

**Лікарська форма.** Капсули.

*Основні фізико-хімічні властивості:* тверді желатинові капсули циліндричної форми № 1, корпус білого кольору, кришечка жовтого кольору. Вміст капсул – порошкоподібна гранульована суміш білого або білого зі злегка жовтуватим відтінком кольору, допускається запах аміаку.

**Фармакотерапевтична група.** Засоби для лікування пептичної виразки та гастроєзофагеальної рефлюксної хвороби. Вісмуту субцитрат. Код АТХ А02В Х05.

**Фармакологічні властивості.**

*Фармакодинаміка.*

Має гастропротекторну дію. У кислому середовищі шлунка вісмуту субцитрат колоїдний утворює на поверхні виразок та ерозій захисну плівку, що сприяє їх рубцюванню і захищає слизову оболонку від впливу шлункового соку. Лікарський засіб стимулює синтез простагландину  $\text{E}_2$ , збільшує утворення муцину і секрецію гідрокарбонату, сприяє накопиченню епідермального фактора росту в зоні дефекту, знижує активність пепсину і пепсиногену.

Препарат має антимікробну активність стосовно *Helicobacter pylori*.

*Фармакокінетика.*

Вісмуту субцитрат колоїдний практично не всмоктується у шлунково-кишковому тракті, лише незначна кількість активної речовини потрапляє у кров та екскретується із сечею, при цьому концентрація вісмуту у плазмі крові після закінчення лікування швидко знижується. Виводиться переважно з калом.

**Клінічні характеристики.**

**Показання.**

Виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки, хронічний гастрит, у тому числі спричинені *Helicobacter pylori* (у складі схем антихелікобактерної терапії).

**Противоказання.**

Підвищена чутливість до діючої речовини або до будь-якого з компонентів лікарського засобу. Тяжка ниркова недостатність.

### ***Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.***

Ніяких інших ліків, їжі або напоїв, антацидів, молока, фруктів або фруктових соків не слід споживати впродовж пів години до або після прийому Віс-Нолу<sup>®</sup>, оскільки вони можуть змінювати його дію.

Зменшує всмоктування тетрациклінів; одночасне застосування препаратів, що містять вісмут (вікалін, вікаір), підвищує ризик надмірного збільшення концентрації вісмуту у крові.

### ***Особливості застосування.***

При застосуванні лікарського засобу можливе забарвлення калу у чорний колір. У такому разі потрібно звернутися за консультацією до лікаря.

Не слід приймати антацидні препарати та вживати молоко за пів години до і пів години після прийому препарату, оскільки наявний шлунковий сік потрібен для формування захисного шару. Тривале застосування високих доз сполук вісмуту не рекомендується через виникнення у рідкісних випадках оборотної енцефалопатії. При дотриманні рекомендованого режиму прийому препарату ризик виникнення цього побічного ефекту дуже малий. Однак протягом прийому Віс-Нолу<sup>®</sup> не рекомендується приймати інші препарати, що містять вісмут.

Лікарський засіб містить барвник «Жовтий захід FCF» (E110), що може спричинити алергічні реакції.

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

Не рекомендується.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.*

Дані про вплив Віс-Нолу<sup>®</sup> на швидкість реакції відсутні. Однак вплив препарату малоймовірний.

### ***Спосіб застосування та дози.***

Приймати всередину, запиваючи невеликою кількістю води.

*Дорослим і дітям віком від 14 років* призначати по 1 капсулі 4 рази на добу за 30 хвилин до їди та на ніч або по 2 капсули 2 рази на добу.

*Дітям віком від 8 до 14 років* призначати по 1 капсулі 2 рази на добу за 30 хвилин до їди.

*Дітям віком від 4 до 8 років* призначати у дозі 8 мг/кг/добу, розподіливши добову дозу на 2 прийоми, але не більше 2 капсул на добу.

Тривалість курсу лікування – 4–8 тижнів. Протягом наступних 8 тижнів не слід приймати препарати, які містять вісмут.

При наявності *Helicobacter pylori* використовувати Віс-Нол<sup>®</sup> у схемах антихелікобактерної терапії за призначенням лікаря.

*Діти.*

Віс-Нол<sup>®</sup> застосовувати дітям віком від 4 років.

### ***Передозування.***

Симптоми інтоксикації.

Гостре масивне передозування може призвести до ниркової недостатності з відстроченим початком до 10 днів.

Лікування інтоксикації.

Після однократного прийому дуже високої дози лікування полягає у промиванні шлунка з подальшим прийомом активованого вугілля та осмотичних проносних засобів. Ця терапія, як правило, зменшує всмоктування вісмуту, тому додаткові заходи не є необхідними.

Концентрацію вісмуту в крові та сечі слід визначати у разі гострої та хронічної інтоксикації для виявлення зв'язку будь-яких симптомів із посиленою дією вісмуту.

Хелатна терапія з димеркаптосукциновою кислотою (ДМСК) і димеркаптопропаносульфоною кислотою (ДМПС) застосовується, якщо симптоми викликані гострим або хронічним передозуванням вісмуту.

У разі тяжкої ниркової недостатності хелатна терапія має супроводжуватись гемодіалізом.

***Побічні реакції.***

Дуже часто (>1/10)

*З боку травного тракту:* випорожнення чорного кольору можливе внаслідок утворення сульфиду вісмуту. Такі випорожнення можна легко відрізнити від мелени.

Нечасто (>1/1000, <1/100)

*З боку травного тракту:* нудота, блювання, запор, діарея.

*З боку шкіри і підшкірної клітковини:* шкірні алергічні реакції легкого ступеня тяжкості (висипання, свербіж).

Дуже рідко (<1/10000), частота невідома (не можна оцінити за наявними даними)

*З боку імунної системи:* анафілактична реакція.

***Термін придатності.*** 4 роки.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

**Умови зберігання.** Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.** № 30 (10×3), № 100 (10×10) у блістері.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.

**Виробник.** АТ «Фармак».

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.**

Україна, 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 74.

**Дата останнього перегляду.** 16.03.2021