

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства
здравоохранения Украины
23.08.12 № 658
Регистрационное удостоверение
№ 10A/7049/08/01

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата

САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА
(SALICYLIC ACID)

Состав лекарственного средства:

действующее вещество: салициловая кислота;
1 мл раствора содержит салициловой кислоты 20 мг;
вспомогательное вещество: спирт этиловый 70 %.

Лекарственная форма.

Раствор накожный спиртовой.
Прозрачная бесцветная жидкость со спиртовым запахом.

Название и местонахождение производителя.

ПАО «Фармак».
Украина, 04080, г. Киев, ул. Фрунзе, 63.

Фармакотерапевтическая группа.

Дерматологические средства. Код АТС D01A E12.

Антисептическое средство. При местном применении оказывает противомикробное, раздражающее, отвлекающее действие.

Показания к применению.

Применяют при инфекционных поражениях кожи: обычных угрях, пиодермии.

Противопоказания.

Повышенная индивидуальная чувствительность к препарату.

Надлежащие меры безопасности при применении.

Не допускать попадания препарата в глаза, не наносить на слизистые оболочки.

Не следует нарушать правила применения лекарственного средства, это может навредить здоровью.

Особые предостережения.

Не следует наносить препарат на большие участки кожи.

Применение в период беременности или кормления грудью.

В период беременности и кормления грудью применение препарата возможно только тогда, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребёнка.

КОНТРОЛЬНИЙ

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.

Не влияет.

Дети.

Не применяют детям до 12 лет.

Способ применения и дозы.

Применяют наружно, смазывая или растирая пораженные участки кожи ватным тампоном, пропитанным препаратом, 2-3 раза в сутки. Курс лечения определяет врач в зависимости от характера и тяжести заболевания.

Передозировка.

При применении больших доз препарата может усилиться кератолитическое действие и аллергические реакции. В таком случае препарат необходимо смыть водой, обратиться за консультацией к врачу. Терапия симптоматическая.

Побочные эффекты.

Возможны изменения со стороны кожи: сухость, шелушение, раздражение, контактный дерматит, проявления аллергических реакций (крапивница, зуд), что требует отмены препарата.

При длительном применении возможно всасывание препарата в общий кровоток и развитие характерных для салицилатов побочных эффектов: шум в ушах, головокружение, боль в эпигастрии, тошнота, рвота, ацидоз, учащённое дыхание.

В случае появления каких-либо нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу!

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.

Местное применение салициловой кислоты не следует комбинировать с пероральным приёмом препаратов, которые содержат ацетилсалициловую кислоту и другие нестероидные противовоспалительные средства. Не применять вместе с бензоилпероксидом и местными ретиноидами.

Салициловая кислота может повысить проницаемость кожи для других лекарственных средств для местного применения и тем самым увеличить их попадание в организм. Кроме того, салициловая кислота может усилить нежелательную реакцию метотрексата и гипогликемическое действие пероральных противодиабетических препаратов производных сульфонилмочевины.

Если Вы принимаете какие-либо другие лекарственные средства, обязательно сообщите об этом врачу.

Срок годности. 3 года.

Не применять препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения. Хранить в защищённом от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка.

По 25 мл во флаконе. По 1 флакону в пачке.

Категория отпуска. Без рецепта.

Дата последнего пересмотра. 23.08.2012

