

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**по медицинскому применению препарата**

**ОТОТОН**  
**(ОТОТОН)**

**Состав:**

*действующие вещества:* 1 г капель содержит феназона в пересчете на 100 % сухое вещество 0,04 г, лидокаина гидрохлорида в пересчете на 100 % безводное вещество 0,01 г;  
*вспомогательные вещества:* натрия тиосульфат, этанол 96 %, глицерин, вода очищенная.

**Лекарственная форма.** Капли ушные.

*Основные физико-химические свойства:* прозрачная, бесцветная или слегка желтоватая жидкость с запахом спирта.

**Фармакотерапевтическая группа.**

Средства, применяемые в отологии. Код АТХ S02D A30.

**Фармакологические свойства.**

*Фармакодинамика.*

Ототон является комбинацией двух активных ингредиентов: феназона и лидокаина.

Феназон: производное пиразолона с анальгетическими и противовоспалительными свойствами.

Лидокаин: местный анестетик амидной группы.

Комбинация феназона с лидокаином обуславливает выраженный обезболивающий/противовоспалительный эффект.

*Фармакокинетика.*

Системное всасывание активных компонентов не предвидится (при отсутствии повреждений барабанной перепонки).

Действие препарата (уменьшение болезненности барабанной перепонки и редукция воспаления) начинается через 5 минут после закапывания. Болевой синдром почти полностью исчезает через 15-30 минут.

**Клинические характеристики.**

**Показания.**

Местное симптоматическое лечение и обезболивание при заболеваниях среднего уха с интактной барабанной перепонкой:

- среднем отите в остром периоде;
- отечном вирусном отите (послегриппозном);
- баротравматическом отите.

**Противопоказания.**

Гиперчувствительность к компонентам препарата или к амидным местноанестезирующим лекарственным средствам. Инфекционное или травматическое повреждение барабанной перепонки.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.**

Нет данных.



### **Особенности применения.**

Перед назначением препарата следует проверить целостность барабанной перепонки.

Если барабанная перепонка перфорированная, введение препарата может привести к контакту препарата со структурами среднего уха, вызывая побочные реакции в этих тканях. Следует учитывать, что препарат содержит активный компонент, который может показать положительный результат в антидопинговом тесте.

### **Применение в период беременности или кормления грудью.**

При необходимости Ототон можно применять в период беременности или кормления грудью после консультации с врачом.

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.**

Препарат не влияет на способность управлять транспортом или обслуживать потенциально опасные механизмы.

### **Способ применения и дозы.**

Взрослым и детям грудного возраста закапывать в наружный слуховой проход 2-3 раза в сутки по 4 капли. Курс лечения не должен превышать 10 дней, после чего нужен пересмотр лечения.

Для того, чтобы предотвратить неприятные ощущения в результате контакта кожи слухового прохода с холодным раствором, следует согреть флакон в руке перед применением лекарственного средства. Потом открутить колпачок с флакона и навинтить капельницу на флакон. Перевернуть флакон и закапать 4 капли, слегка надавливая на центральную часть капельницы. После применения плотно закрутить белый колпачок на капельнице и вложить флакон в упаковку.

*Дети.* Применять детям грудного возраста по назначению врача.

### **Передозировка.**

При применении препарата в рекомендованной дозировке передозировка маловероятна.

### **Побочные реакции.**

Очень редко могут возникать местные аллергические реакции, раздражение, гиперемия наружного слухового прохода, зуд, кожные высыпания.

### **Срок годности.** 2 года.

Срок годности после вскрытия флакона – 1 месяц.

Не применять препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке.

### **Условия хранения.**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

### **Упаковка.**

По 16 г во флаконе. По 1 флакону в пачке.

**Категория отпуска.** Без рецепта.

**Производитель.** ПАО «Фармак».

**Местонахождение производителя и адрес места проведения его деятельности.**

Украина, 04080, г. Киев, ул. Фрунзе, 63.

**Дата последнего пересмотра.** 01.08.2014

