

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ РАСТВОР для обработки рук

ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ: Дезинфицирующий раствор для обработки рук.

ФОРМА ВЫПУСКА: стеклянные флаконы по 25 мл (ml) или 50 мл (ml)

ОПИСАНИЕ: жидкость голубого цвета со специфическим запахом, густота 20 °С - не менее 0,8 г/см³ (g/cm³).

СОСТАВ

1 мл (ml) раствора содержит спирт этиловый 96% - 0,8333 мл (ml), глицерин 98% - 0,0145 мл (ml), перекись водорода 3% раствор - 0,0417 мл (ml), патентованный синий V (Е 131), вода очищенная.

Состав дезинфицирующего раствора для обработки рук разработан в соответствии с рекомендациями ВОЗ (<https://www.who.int/gpsc/5may/tools/9789241597906/en/>)

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ РАСТВОР ДЛЯ ОБРАБОТКИ РУК ПРИМЕНЯЕТСЯ для гигиенической и антисептической обработки рук.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Дезинфицирующий раствор для обработки рук можно использовать везде.

Существующая система дозирования позволяет отбирать дезинфицирующее средство бесконтактно.

Последовательность метода втирания антисептика для гигиенической обработки рук согласно с Европейским стандартом EN 1500. Руки после антисептической обработки не нужно мыть.

Методика гигиенической антисептической обработки кожи рук

Использовать до и после контакта без видимого загрязнения рук.

Минимум 10-15 капель дезинфицирующего раствора для обработки рук отбирают непосредственно из флакона с помощью дозирующего устройства в углубление сухой ладони. После этого средство активно втирают в ладони, пальцы, между пальцами, в кожу на тыльной стороне ладони, в кутикулы и подногтевые щели, запястья.

Средство необходимо втирать в течение 30 секунд.

В случае необходимости - повторить втирание с новой порцией антисептического средства.

Следить за тем, чтобы в течение всего времени втирания руки оставались увлажненные препаратом.

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ РАСТВОР ДЛЯ ОБРАБОТКИ РУК НЕ ПРИМЕНЯТЬ при повышенной чувствительности к компонентам средства; для антисептической обработки слизистых оболочек, открытых ран и участков вокруг глаз.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Не переливать Дезинфицирующий раствор для обработки рук с одного флакона в другой, так как это может стать причиной загрязнения средства. В случае, когда переливание предотвратить невозможно, процедуру следует проводить с соблюдением стерильности.

При случайном пролипании средство необходимо немедленно собрать и развести большим количеством воды, проветрить помещение, убрать легковоспламеняющиеся предметы.

Не курить. Избегать контакта с открытым пламенем. Не применять вблизи источников возгорания. В случае пожара использовать воду, огнетушители (порошковые, пенные или углекислотные).

Пользоваться электрическими приборами только после полного высыхания средства.

В период беременности и кормления грудью неизвестны риски при применении препарата.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Возможны аллергические реакции, проявления раздражения кожи при повышенной чувствительности к компонентам средства. При случайном попадании средства в желудок возможно алкогольное отравление, пострадавшему необходимо сполоснуть ротовую полость питьевой водой, дать выпить несколько стаканов воды, при необходимости провести промывание желудка. При случайном попадании средства в глаза возможно раздражение слизистой оболочки глаз, пострадавшему необходимо промыть глаза проточной водой в течение нескольких минут и обязательно обратиться к врачу.

Сообщение о любом серьезном инциденте, который произошел с изделием

Для обеспечения дальнейшего эффективного и безопасного применения изделия, просим сообщать про побочные эффекты и инциденты, выявленные в процессе применения этого изделия, оператору рынка: АО «Фармак», Украина, 04080, г. Киев, ул. Кирилловская, 63, тел. +38 (044) 239 19 40.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в местах, недоступных для детей. Легковоспламеняющееся. Следует соблюдать правила техники безопасности при работе со спиртосодержащими средствами.

Срок годности: 12 месяцев.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: АО «Фармак», Украина, 04080, г. Киев, ул. Кирилловская, 74.

Дата последнего просмотра. 06.04.2020 г.